

SpeediCath® Short

Qualidade concentrada

Transforme a forma como suas
pacientes realizam o cateterismo
com um cateter curto, discreto e
pronto para uso da Coloplast.

Andrea
Usuária

SpeediCath® Short

O que as suas pacientes precisam?

“O que mais valorizo em um cateter é o tamanho – por ser curto, posso levá-lo para qualquer lugar.”

Andrea
Usuária

SpeediCath® Short

Iniciar a jornada do cateterismo intermitente pode ser desafiador, mas, uma vez dominado, esse processo pode transformar vidas para melhor.

Compreender as necessidades das suas pacientes é essencial para garantir que elas não abandonem o cateterismo intermitente.

O que os pacientes precisam?

> Discrição

Mulheres que utilizam cateter desejam manter sua intimidade. Um cateter discreto, fácil de carregar na bolsa, ajuda a evitar estigmas sociais.*

> Independência

O cateterismo deve ser fácil de integrar na rotina, promovendo autonomia.

> Cateterismo suave e higiênico

O processo deve ser confortável e garantir o esvaziamento completo da bexiga, reduzindo o risco de infecções urinárias (ITU).

* Estudo ReD Associates, Dados em arquivo, Estudo de Mercado Coloplast, 2017, n=40

Quais são as preocupações das pacientes?

O risco de infecções urinárias, o desconforto e a praticidade são preocupações frequentes entre mulheres que realizam cateterismo.

Muitas pacientes se preocupam com a falta de discrição ao usar o cateter fora de casa e com um design que não seja suficientemente higiênico ou prático. A sustentabilidade também pode ser um fator considerado por quem utiliza cateter.

Todos esses aspectos podem impactar negativamente a qualidade de vida.

1,825

Uma usuária de cateter realiza, em média, 1.825 cateterismos por ano*. Por isso, proteger a uretra e garantir discrição são igualmente importantes.



74%

concordam que o cateter precisa ser fácil de transportar.




84%

se preocupam com o risco de ITU durante o uso.

*Cálculo baseado nas Diretrizes da EAUN, que recomendam que um paciente adulto realize cateterismo de 4 a 6 vezes ao dia. Considerando 5 vezes ao dia durante 365 dias, o total é de aproximadamente 1.825 cateterismos por ano.

*Pesquisa com usuárias de cateterismo intermitente da Coloplast (IC Value Prop), n=2942, janeiro de 2016 (Dados em arquivo)

SpeediCath® Short



“Quando estou fora de casa, consigo usar o SpeediCath Short sem tocar diretamente nele, então ele permanece higiênico.”

Maria
Usuária


Como o SpeediCath® Short pode ajudar suas pacientes?



O cateter SpeediCath® Short oferece todos os benefícios clinicamente comprovados do SpeediCath® Standard em uma versão mais curta*, prática, discreta e pronta para uso imediato. É um cateter que pode ser facilmente integrado à rotina diária das suas pacientes e levado para onde for necessário.

Os principais benefícios para suas pacientes:

1. Inserção e retirada suaves
2. Menor risco de ITUs**
3. Curto*, discreto e fácil de transportar
4. Fácil de manusear
5. Menor impacto ambiental*††



*Comparado ao SpeediCath Standard feminino

**Comparado a cateteres sem revestimento

† Testado em ambiente pré-clínico, Coloplast, Dados em arquivo, SC Short: 04/24, n=54; Lofric Sense: 02/20, n=60; Lofric Elle: 02/20, n=30; Actreen Mini (usando métodos diferentes, mas comparáveis): 02/22, n=45

†† Redução de 35% nas emissões de CO₂e. Baseado em pegada de carbono validada externamente, conforme ISO14067

§ Proveniente do cateter e da embalagem primária

Inserção e remoção suaves

Pode ser difícil para as pacientes se acostumarem tanto com a ideia quanto com o processo físico do cateterismo. É comum haver receio quanto ao conforto durante o uso. Por isso, a Coloplast prioriza o bem-estar durante a inserção e a remoção do cateter, e diversas características do design do SpeediCath® Short foram desenvolvidas para proporcionar um procedimento mais suave.

1. Tecnologia de revestimento TAC™
2. Menor atrito em comparação com concorrentes

* Testado em ambiente pré-clínico, Coloplast, Dados em arquivo. SC Short: 04/24, n=54; Lofric Sense: 02/20, n=60; Lofric Elle: 02/20, n=30; Actreen Mini (usando métodos diferentes, porém comparáveis): 02/22, n=45.

SpeediCath® Short

“Para mim, foi essencial sentir que sou uma pessoa normal.”

Maria
Usuária



Menor risco de ITUs

É compreensível que muitas pacientes sintam ansiedade em relação ao cateterismo e ao risco de infecções urinárias (ITUs). Por isso, estabelecer uma rotina de cateterismo que seja o mais higiênica possível é essencial. Optar por um cateter com revestimento hidrofílico ajuda a reduzir o risco de ITUs em comparação com cateteres não revestidos.

1. Boa rotina de cateterismo
2. Orifícios revestidos e polidos

SpeediCath® Short



“O revestimento é importante para não machucar a uretra.”

Andrea
Usuária

Curto, discreto e fácil de transportar

Cateteres com um design claramente clínico podem gerar perguntas constrangedoras que suas pacientes preferem evitar. O SpeediCath® Short foi desenvolvido para ser discreto e se integrar à rotina diária das pacientes.

1. Consideravelmente menor*
2. Mais discreto** e prático
3. Curto, mas com comprimento ideal†
4. Embalagem moderna

* Comparado ao SpeediCath Standard feminino

** Comparado ao SpeediCath Standard, Coloplast, Dados em arquivo, Avaliação de produto, 11/2023, Espanha, N=28, intervalo de confiança de 95% [0,88–1,00]

† Para a anatomia feminina

†† Coloplast, Dados em arquivo, Avaliação de produto, 11/2023, Espanha, N=28, intervalo de confiança de 95% [0,72–1,00]

SpeediCath® Short



“Consigo carregá-lo na mão sem que ninguém perceba.”

Maria
Usuária de CI

Fácil de manusear

Viver com cateterismo intermitente é uma jornada. Desenvolver um design fácil de usar ajuda as pacientes a se acostumarem com o cateterismo e a tornarem o processo o mais natural possível. Dessa forma, o SpeediCath® Short ajuda suas pacientes a assumirem o controle do próprio cateterismo.

1. Design aprimorado
2. Embalagem com abertura por anel e ponto adesivo
3. Design otimizado para pequenos espaços*

*Comparado ao SpeediCath Standard

SpeediCath® Short



“O SpeediCath® Short é mais fácil – o tamanho e o adesivo ajudam muito em espaços pequenos.”

Pai de Aiuri
Usuária, cateter

Menor impacto ambiental

Com o SpeediCath Short, buscamos equilibrar as necessidades das usuárias e do planeta. Produzido sem ftalatos e livre de PVC, o cateter apresenta 35% de redução nas emissões de CO₂e^{***}, e 55% menos resíduos^{**},† — resultando em menor impacto ambiental*.

- 55% menos resíduos gerados no descarte*,†
- 35% de redução nas emissões de CO₂e^{**,**}
- Livre de ftalatos e PVC

* Comparado ao SpeediCath Standard feminino

** Com base na pegada de carbono validada externamente, conforme a norma ISO14067

† Proveniente do cateter e da embalagem primária

SpeediCath® Short



“Além de menores, fico feliz em saber que os novos cateteres são mais sustentáveis.”

Maria
Usuária de CI

Principais características e benefícios do SpeediCath Short



- Embalagem: 19 cm
 - Comprimento total: 12 cm
 - Comprimento efetivo: 8cm
- Tamanhos disponíveis: CH 10 a 14

Aprovado pelas pacientes

Um estudo recente com usuárias do SpeediCath Short revelou que:

93%*

concordam ou concordam fortemente que a embalagem não se parece com um produto médico

96%*

concordam ou concordam fortemente que a embalagem é discreta

96%*

concordam ou concordam fortemente que o tamanho do produto facilita o armazenamento

89%*

concordam ou concordam fortemente que a embalagem tem aparência moderna

* Coloplast, Dados em arquivo, Avaliação de produto, 11/2023, Espanha, N=28, intervalo de confiança de 95% [0,72–1,00]

** Para a anatomia feminina

† Comparado a cateteres sem revestimento

†† Comparado ao SpeediCath Standard feminino

§ Com base na pegada de carbono validada externamente, conforme a norma ISO14067

§§ Proveniente do cateter e da embalagem primária

- ¹. Vaabengaard R, Zeeberg R, Athanasiadou S. Challenges and priorities of intermittent catheterisation users: Results from an online user survey. Poster presented at BAUN 2023. (n=3784).
- ². Barber AE, Norton JP, Spivak AM, et al. Urinary tract infections: current and emerging management strategies. Clin Infect Dis. 2013;57(5):719-24.
- ³. Kennelly M, Thiruchelvam N, Averbeck MA, et al. Adult Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction and Intermittent Catheterisation in a Community Setting: Risk Factors Model for Urinary Tract Infections. Adv Urol. 2019;2019:2757862.
- ⁴. Vasudeva P, Madersbacher H. Factors implicated in pathogenesis of urinary tract infections in neurogenic bladders: some revered, few forgotten, others ignored. Neurourol Urodyn. 2014;33(1):95-100.
- ⁵. Stensballe J, Looms D, Nielsen PN, et al.: Hydrophilic coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma: a prospective, randomised, participant-blinded, cross-over study of three different types of catheters. Euro. Urol. 2005,48 (6):978-983).