



Newsletter de Continence Care Para profissionais de saúde

Coloplast®
Professional

AJUDANDO OS PACIENTES A IDENTIFICAR “ZONAS SEGURAS”

Uma parte importante para fazer os pacientes aderirem ao cateterismo intermitente limpo (CIL) é ajudá-los a ver como isso pode se encaixar em sua rotina diária. É tudo sobre como orientar sua transição do ambiente clínico seguro para o mundo exterior, onde as coisas são menos estruturadas ou “seguras”.

Para a zona de segurança

Muitos pacientes se preocupam com a transição do hospital para casa. Uma maneira de abordar essa preocupação é ajudar o paciente a estabelecer “zonas seguras”¹. Seja dentro ou fora de casa, uma zona segura é um lugar que é:

LIMPO

Os pacientes precisam saber onde encontrar, ou como criar, um ambiente limpo para o cateterismo

PRIVADO

Os pacientes precisam de privacidade durante o cateterismo. Isso os ajuda a manter a dignidade e o senso de controle

ACESSÍVEL

Os pacientes precisam de um espaço ao seu alcance para realizar o cateterismo. Também deve atender a sua necessidade de transferência e postura

Se o paciente estiver preocupado em encontrar o local certo para realizar o CIL quando estiver fora de casa, ajudar o paciente a usar o GPS ou aplicativos de celular para localizar banheiros públicos e para deficientes físicos pode proporcionar paz de espírito e uma maior sensação de controle.

Referências

1. Coloplast_Market_Study_ReD Associates Study_2007_Data-on-file (VV-0206734)

Uma vida melhor

Ostomy Care, Continence Care, Wound & Skin Care and Interventional Urology

VOCÊ SABIA....

Realizar CIL fora de casa é um desafio, e...

3 em cada 10 usuários de CIL têm rotinas do procedimento diferentes fora de casa

Destes, **3** em cada 10 banheiros públicos são construídos de forma que dificulta seguir suas rotinas normais de CIL

2 de 10 afirmam que não têm o espaço necessário para completar sua rotina de CIL²

Referências

1. Coloplast_Market_Study_IC Research_2015_Data-on-file (VV-0206732)